

你以為被蚊子叮咬 只是小事嗎？



如果輕忽登革重症，
若未及時就醫治療，死亡率可達50%

「登革熱重症」症狀

- ◎嚴重血漿滲漏，導致休克
- ◎嚴重血漿滲漏，導致體液蓄積及呼吸窘迫
- ◎嚴重出血
- ◎嚴重器官損傷（肝臟功能損傷、中樞神經系統受損、心臟衰竭、腎功能損傷、心肌病變、腦病變、腦炎等）



登革熱 臨床症狀



如何預防登革熱及注意事項:

- ◎每周選擇一天定期主動清除家戶內外，利用10分鐘時間檢查及清除蚊子的家-積水的容器（如登革熱病媒蚊孳生源自我檢查表項下），
落實「巡」、「倒」、「清」、「刷」四步驟。
- ◎出入發生疫情地區應穿著淡色長袖長褲，身體裸露部位塗抹防蚊藥品。
- ◎曾感染登革熱者，應避免至登革熱高風險區，以免遭病媒蚊叮咬而交叉感染登革熱重症。

* 鄉親如有疑似登革熱症狀，應盡速就醫，並主動告知醫師旅遊史及近期活動史，建議停止上班上課，做好隔離措施。

24小時諮詢及通報專線 **8226975**

花蓮縣環境保護局 廣告